

قلیان سبب ابتلا به بیماریهای عفونی و ناباروری می شود



استفاده مشترک از شیلنگ قلیان سبب ابتلا مصرف کنندگان به بیماری های عفونی مانند هیپاتیت B می شوند.

قلیان سبب ابتلا به بیماریهای عفونی و بروز ناباروری می شود

قلیان بطور شایع در میان خانواده ها ، کودکان و زنان در مناطقی که شکل رایج مصرف تنباکو در زنان میزان بسیار پائینی دارد، مصرف می شود علاوه بر این با عرضه تنباکو طعم دارد معطر ، مصرف قلیان بطور چشمگیری در میان جوانان و نوجوانان پسرودختران رو به افزایش است .

یکی از متخصصان در این زمینه با اشاره به اینکه مصرف قلیان در جامعه افزایش یافته است، افزود: سن شروع مصرف دخانیات در بین جوانان و نوجوانان در ۲ سال اخیر به ۱۳ سال کاهش یافته است . وی ادامه داد: براساس آخرین مطالعات صورت گرفته، حدود ۳۷ درصد از نوجوانان و جوانان کشور قلیان استعمال می کنند و متأسفانه قبح مصرف قلیان در جامعه شکسته شده است.

با اشاره به اینکه شواهدی مبنی بر تاثیر قلیان بر میزان و طول عمر / سپرم دارد، افزود: قلیان حاوی فلزات سنگین مانند آرسنیک، کروم و سرب است که می تواند سبب کاهش تولید اسپرم و عوارض جبران ناپذیری بر باروری داشته باشد.

قلیان کشیدن دیگر چندان به عنوان یک ضدارزش در جامعه تلقی نمی شود و به همین دلیل در تلاش هستیم با اجرای برنامه های مناسب اجتماعی از جمله پویش «قلیان هایمان را گلدان کنیم» گامی موثر در این مسیر برداریم.



مضرات قلیان کشیدن

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران به باورهای نادرست در خصوص مصرف قلیان اشاره کرد و گفت: بکسری باورهای نادرست در باره مصرف قلیان وجود دارد که سبب افزایش مصرف آن شده است .

وی با اشاره به اینکه دود استفاده از قلیان بر روی تمام افراد خانواده تاثیر می گذارد، گفت: در صورتی که کودکی در محل کشیدن قلیان حضور داشته باشد، احتمال ایجاد عفونت های ریوی، آسم و

سندرم مرگ ناگهانی در آنان افزایش می یابد .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: حجم دودی که در اثر مصرف قلیان وارد بدن می شود، ۱۰ تا ۲۰ برابر دود ناشی از مصرف سیگار است و این موضوع خیلی نگران کننده است.